

Kod osoba koje svakodnevno koriste kanabis ili "skunk", genetski uzgojenu marihuanu s većom dozom psihoaktivne supstancije THC, postoji triput veća vjerojatnost od razvoja nekog psihotičnog poremećaja nego kod osoba koje ih nisu nikada koristile.

Rezultati zadnje provedene studije, objavljeni u stručnome časopisu Lancet Psychiatry, u skladu su s ranijim istraživanjima koji upućuju na to da česta upotreba marihuane s visokom koncentracijom THC može biti štetna za mentalno zdravlje.

"Riječ je o osobama koje ispunjavaju dijagnostičke kriterije i onima koje se javljaju službama za mentalno zdravlje zbog liječenja psihoze. Preciznije, riječ je o osobama koje su imale simptome šireg spektra, poput halucinacija koje su trajale po najmanje tjedan dana", pojasnila je voditeljica studije Marta Di Forti s Odjela za psihijatriju, psihologiju i neuroznanost londonskoga King's Collegea.

Da bi ustanovili postoji li povezanost između upotrebe marihuane i psihoze, Di Forti i suradnici su pregledali podatke prikupljene u 11 europskih i jednome brazilskom gradu. Među europskim gradovima su bili Amsterdam, London i Pariz.

Analizirali su podatke prikupljene među više od 1200 pacijenata bez psihoze te su ih usporedili s podacima prikupljenom kod 900 osoba koje su u tom petogodišnjem razdoblju pokazivale prve znakove psihoze. Ustanovljeno je da se psihoza češće evidentirana među osobama koje su svakodnevno koristile marihuanu.

Istodobno su zamijetili da je u gradovima u kojima je upotreba marihuane legalizirana, stopa psihotičnih poremećaja u cjelokupnoj populaciji veća. Primjerice, u Amsterdamu u kojemu je marihuana s visokim postotkom THC široko dostupna i kod osoba koje su kazale da je svakodnevno koriste, izgledi za pojavu psihotičnih epizoda bili su devet puta veći u odnosu na osobe koje je nisu koristile.

Istodobno je 30 posto ispitanika s psihozom prijavilo svakodnevno korištenje marihuane u odnosu na sedam posto onih iz kontrolne grupe. Znanstvenici su ustanovili i da je korištenje marihuane s visokom koncentracijom THC bilo češće među pacijentima nego u kontrolnoj grupi. U postocima je to bilo 37 prema 19 posto.

No studija ne isključuje mogućnost postojanja "obrnute uzročno-posljedične veze". To znači da ljudi s psihozom češće koriste marihuanu nego zdrave osobe, smatra Suzi Gage s Odjela za psihološke znanosti Sveučilišta u Liverpoolu, koja nije sudjelovala u istraživanju.

Mnoge su zemlje legalizirale i dekriminalizirale upotrebu kanabisa. Trenutačno je njegova upotreba u medicinske svrhe legalna u većini europskih država, no slobodna upotreba legalna je samo u Nizozemskoj, Španjolskoj i u Češkoj. Brojne države raspravljaju o mogućnosti legalizacije.

Di Forti smatra da bi, kada se marihuana s visokim postotkom THC-a više ne bi nudila u slobodnoj prodaji, incidencija psihoza u, primjerice Amsterdamu, na populaciji od 100.000 ljudi pala s 37,9 posto na 18,8 posto, a u Londonu s 45,7 posto na 31,9.

Znanstvenici pronašli poveznice između korištenja kanabisa i simptoma psihoze

Kategorija: MAGAZINAžurirano: Četvrtak, 21 Ožujak 2019 13:07

Objavljeno: Četvrtak, 21 Ožujak 2019 13:07

Robin Murray, profesor i psihijatar sa Sveučilišta u Glasgowu, koji je radio na studiji kaže da bi o tomu trebali povesti računa i političari i korisnici marihuane.

"Prije petnaest godina nitko nije ni mislio da bi marihuana mogla utjecati na povećanje rizika od razvoja psihoze. No danas raspolažemo vrlo konkretnim podacima o tomu", kazao je Murray.

(Hina)

