

Rak napada pretile i četiri puta češće no ostale

Kategorija: MAGAZINAŽurirano: Subota, 10 Kolovoz 2019 09:21
Objavljeno: Subota, 10 Kolovoz 2019 09:21

Višak kilograma drugi je među uzrocima raka, odmah nakon pušenja, u razvijenim zemljama, zaključak je studije kojom je utvrđeno da je veličina rizika dosad pripisivana debljini za obolijevanje od raka bitno veća no što se to smatralo, piše u subotu Večernji list.

Rad skupine autora, objavljen u International Journal of Epidemiology, navodi da debljina čini dvostruko veći rizik za rak bubrega, jajnika, maternice i adenokarcinom jednjaka, četiri puta za rak gušterače i rak debelog crijeva.

Do takvog zaključka došlo se specifičnom metodom, tzv. Mendelovom randomizacijom i analizom akumulirane izloženosti višku kilograma tijekom godina, navodi dnevnik.

"Mendelova randomizacija proizvodi procjene uzročnih odnosa, konkretnije, koristi pojedine varijacije gena s poznatom funkcijom s ciljem procjene kauzalnih učinaka na nastanak nekog procesa, bolesti itd.", pojašnjava za Večernji list genetičar Dragan Primorac.

Napominje da rezultati dobiveni takvom analizom nemaju apsolutnu sigurnost budući da nisu ukalkulirali nepoznate genetske varijacije koje također mogu imati veliku ulogu u nastanku bolesti.

Dosad se, kako stoji u studiji, smatralo da se šest posto svih vrsta raka može pripisati debljini, ali podaci prikupljeni za taj rad kažu da je taj podatak vjerojatno podcijenjen.

Spomenuta studija nije prva koja se bavi istraživanjem debljine kao uzročnika pojedinih vrsta raka, ali otkriva da je ta povezanost puno veća nego što se dosad mislilo, ističe Večernji list. (H)

