

Više od 1,2 milijuna ljudi umrlo je od infekcija otpornih na lijekove

Kategorija: SVIJETAžurirano: Četvrtak, 20 Siječanj 2022 08:20
Objavljeno: Četvrtak, 20 Siječanj 2022 08:20

#ISTRAŽIVANJE - TRADICIONALNI MODEL LIJEČENJA S ANTIBIOTICIMA, KOJI SMO IMALI POSLJEDNJIH NEKOLIKO DESETLJEĆA OD PENICILINA, POTROŠEN#

Više od 1,2 milijuna ljudi u svijetu umrlo je 2019. od infekcija uzrokovanih bakterijama otpornim na više antibiotika, što je više nego što je umrlo od HIV/AIDS-a ili malarije, prema novom izvješću objavljenom u četvrtak.

Svjetski zdravstveni dužnosnici u više su navrata upozoravali na širenje bakterija i drugih mikroba otpornih na lijekove zbog zlouporabe i prekomjerne uporabe antibiotika, što potiče mikroorganizme da se razviju u "supermikrobe".

Novo globalno izvješće o otpornosti mikroba objavljeno u medicinskom časopisu Lancet otkrilo je da je antimikrobna rezistencija (AMR) izravno odgovorna za procijenjenih 1,27 milijuna smrtnih slučajeva i povezana s oko 4,95 milijuna smrtnih slučajeva.

Studija je analizirala podatke iz 204 zemlje i teritorija.

"Ovi novi podaci otkrivaju pravi razmjer antimikrobne rezistencije u cijelom svijetu... Prethodne procjene predviđale su 10 milijuna godišnjih smrtnih slučajeva od AMR-a do 2050., ali sada sa sigurnošću znamo da smo već daleko bliže toj broju nego što smo mislili", rekao je Chris Murray, koautor studije i profesor na Sveučilištu Washington.

Prošle je godine Svjetska zdravstvena organizacija upozorila da nijedan od 43 antibiotika u razvoju ili nedavno odobrenih lijekova nije dovoljan za borbu protiv antimikrobne rezistencije.

Cornelius Clancy, profesor medicine na sveučilištu u Pittsburghu, rekao je da je jedan od načina za rješavanje problema AMR-a tražiti novi model liječenja.

"Mislim da je tradicionalni model s antibioticima, koji smo imali posljednjih nekoliko desetljeća od penicilina, potrošen."

Većina smrtnih slučajeva u 2019. uzrokovana je rezistencijom na lijekove u infekcijama donjih dišnih puteva kao što je upala pluća, nakon čega slijede infekcije u krvotoku i intraabdominalne infekcije.

Utjecaj AMR-a sada je najteži u podsaharskoj Africi i južnoj Aziji, dok je otprilike svaki peti smrtni slučaj zabilježen kod djece mlađe od pet godina.

Znanstvenici su izvijestili da je dostupnost podataka za neke regije, osobito mnoge zemlje s niskim i srednjim dohotkom, bila ograničena što može utjecati na točnost procjena studije.

Clancy je rekao da je fokus bio na covidu-19 u posljednje dvije godine, ali je AMR "dugoročni izazov". (Hina)

Više od 1,2 milijuna ljudi umrlo je od infekcija otpornih na lijekove

Kategorija: SVIJETAžurirano: Četvrtak, 20 Siječanj 2022 08:20

Objavljeno: Četvrtak, 20 Siječanj 2022 08:20

